










## Handlungsleitfaden zur Wiederezulassung nach Krankheiten in Grundschulen und offenen Ganztagschulen in Kamen

Erkrankung	Dauer	Schule/ OGS?	Empfehlungen zur Zulassung/ Wiederezulassung	Hinweise
Augen-/ Bindehautentzündung: In Verbindung mit Schnupfen, verklebten Augen	Individuell, verschwindet spontan			Kaum ansteckend
Augen-/ Bindehautentzündung: Mit gerötetem Augenweiß	5 bis 7 Tage		Nach vollständiger Ausheilung	
Fieber (ohne weitere Symptome)	Individuell		Mindestens ein vollständig fieberfreier Tag	
Durchfall und/oder Erbrechen	Meist wenige Tage, bei einigen Erregern auch länger		Mindestens ein vollständig durchfallfreier Tag	Von Durchfall ist auszugehen, wenn zweimal an einem Tag dünnflüssiger Stuhlgang auftritt.
Erkältungskrankheiten/ Infekte der oberen Atemwege: <u>Ohne</u> Fieber	Ca. eine Woche			
Erkältungskrankheiten/ Infekte der oberen Atemwege: <u>Mit</u> Fieber	Ca. eine Woche		Mindestens ein vollständig fieberfreier Tag	
Hand-Mund-Fuß-Krankheit	7 bis 14 Tage		Wenn keine <u>neuen</u> Bläschen mehr auftreten; mindestens ein vollständig fieberfreier Tag	Die Ausbreitung der Krankheit wird mit der Isolation Erkrankter kaum verhindert.
Mittelohrentzündung	Einige Tage		Nach Genesung	In der Regel nicht ansteckend
Ringelröteln	Wenige Tage			Mit Beginn des Ausschlags besteht keine Ansteckungsgefahr mehr, früheres Erkennen ist nicht möglich. Die Krankheit ist gefährlich für schwangere Frauen bzw. Ungeborene.

*Hinweis:* In Schulen kommt es immer wieder zum Befall durch **Kopfläuse**. Wenn Sie dies bei Ihrem Kind feststellen, sind Sie **verpflichtet** Ihre Schule zu informieren!